

2. Vilka skall utrustas med adrenalin som anafylaxiprofylax?

Patient med anamnes på kraftig allergisk överkänslighetsreaktion skall informeras skriftligt, muntligt och praktiskt om akutbehandling. Denna information skall upprepas regelbundet så länge indikationen kvarstår.

Indikation för förskrivning av adrenalin som anafylaxiberedskap:

- alla som haft anafylaxi grad 2 och 3 utlöst av bi/geting eller födoämnen
- alla med allergi mot födoämnen t.ex. jordnötter eller nötter som reagerat med allergiska symtom vid kontakt med luftburet allergen
- alla som haft anafylaxi grad 2 och 3 utlöst av okänd orsak vid mer än 1 tillfälle

Relativ indikation för förskrivning av adrenalin som anafylaxiberedskap:

- vid svår latexallergi
- vid anafylaxi grad 1 där speciella yttre omständigheter föreligger såsom långt avstånd till sjukvård

Ej indikation för förskrivning av adrenalin som anafylaxiberedskap:

- de flesta med anafylaxi grad 1
- vid enbart akuta hud/slemhinnereaktioner eller anafylaxi utlöst av läkemedel
- vid ASIT/hyposens-behandling för bi- och getingallergi efter 1 års behandling

Förskrivning av adrenalin kräver utförlig information och praktisk träning!!

Skriv alltid ut minst två adrenalinpennor!