



B. Definitioner

3. Stadieindelning vid bedömning av astma/obstruktiv bronkit hos barn under 3 års ålder

Reviderad.
2014

Giltighetstid: 3 år

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.

Stadium	Aktivitet, AT	Andn frekv per minut	Indragning *	Blekhhet/ cyanos	Pip-/ väsljud	SaO2 (pulsoximetri)	Andningstyp, åtgärd mm
0	Normalt	20 - 30	0	0	0	Över 96 %	normalt
1	Normalt	25 - 30	0	0	(+)**		förlängd utandn vid ansträngn
2	Gör vilopaus	30 - 40	+	0	(+)**		förlängd utandning
3	Opåverkad i vila, orkar leka lite	40 - 50	+(+)	0	++	91-96 %	pressar, lätt uppblåst
4	påverkad i vila	>50	++	0	+++	86-90 %	pressar!, upp-blåst, indrag även interkostalt, ev blodgasanalys!
5	Påverkad! orolig, trött, orkar bara andas	>50	+++	+	+++	85 % eller lägre	kraftigt ansträngd andning, växlande andningsljud, blodgasanalys
6	Starkt påverkad, kallsvettig, orolig somnolent orkar knappast andas	Varierar		++			svagt andningsljud, kraftigt uppblåst, respiratorberedskap!

* Halsgropen, subkostalt, interkostalt

** I vila hörbart endast med stetoskop och kompression av torax, vid forcerad andning efter aktivitet hörbart även på avstånd

Om du nått detta dokument via en sökmotor bör du gå till www.barnallergisektionen.se för att se det i sitt rätta sammanhang