

Trappa upp mjölkinnehållet i kosten stegvis under 2-3 veckor.

Prova varje steg i minst tre dagar, gärna en vecka. Om barnet inte uppvisar några symtom går det bra att fortsätta till nästa steg. Om symtom, backa till steget närmast före. Det är viktigt att fortsätta ge den mängd som barnet tål.

STEG 1:

- Börja med att använda vanligt mjölkinnehållande margarin på smörgås och i matlagning eller till bakning, liksom bröd eller bakverk bakat på mjölk.
- Servera pålägg och livsmedel som innehåller mjölkpulver, som t ex leverpastej eller korv
- Återinför en mindre mängd grädde eller mjölk, ca 1-2 msk, i matlagning.

STEG 2:

- Servera maträtter som innehåller en större mängd mjölk som t ex pannkaka, lasagne och gratänger.
- Erbjud en liten mängd, ca 0,5 dl, syrad mjölkprodukt såsom yoghurt eller filmjölk.
- För barn som dricker välling eller äter pulvvergröt kan man börja med att blanda 1 msk vanligt mjölkbaserat välling- eller grötpulver i den mjölkfria varianten.
- Prova att servera ost som pålägg.

STEG 3:

- Ge mjölk som dryck eller till gröt.
- Servera mjölkbaserad välling.
- Öka mängden yoghurt eller filmjölk till normal portion ca 1,5- 2 dl
- Prova även att servera glass som innehåller mjölk och/eller grädde

Det kan ibland ta tid för barn som stått på mjölkfri kost att vänja sig vid att dricka mjölk eller att äta mejeriprodukter, ev. kan man på nytt behöva se över kalciumintaget.

Vid ev. reaktion tag kontakt med din läkare.....